



# Клубника

Садовая земляника, известная среди дачников под названием клубника, пользуется большой популярностью за счет своих вкусовых качеств, раннего срока созревания и быстрого плодоношения.

Консультант: Екатерина Кумпан, к. с.-х. н., доцент кафедры садоводства, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

**С**адовой землянике, или клубнике подходят почти все типы почв, но лучше всего она растет и плодоносит на оптимально увлажненном грунте с pH 5,5–6,5. Ее выращивают на достаточно ровных участках или на небольших склонах, защищенных от ветров. Не рекомендуется высаживать клубнику на солончаковых, известняковых, заболоченных, очень кислых и сильно переувлажненных почвах. Эта культура тяжело переносит

недостаток влаги в верхнем слое земли (20 см). Также она боится похолоданий — корни могут погибнуть даже при кратковременном снижении температуры почвы в корнеобитающем слое до  $-8^{\circ}\text{C}$ , а зимующие листики растений — при  $-15^{\circ}\text{C}$ . Вымерзание возможно в холодные малоснежные зимы и в период резких колебаний температуры.

## ПОСАДКА

Высаживают садовую землянику в августе-сентябре или весной, в первые дни поле-



## ПОСАДКА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ



**1** Для посадки берут укоренившиеся розетки (рассаду).

**2** Перед посадкой рассаду можно замочить в глиняной болтушке.

**3** Сначала готовят лунки для посадки земляники, затем их поливают.

**4** Рассаду высаживают так, чтобы верхушечная почка была на уровне почвы.



Садовую землянику размножают укоренившимися розетками, которые образуются на стелющихся побегах — усиках, а также семенами и делением кустов.

**5** После посадки кусты клубники поливают, если земля не сильно влажная.

**6** При рядовой посадке между растениями выдерживают расстояние 15–20 см.

**7** Почву после посадки земляники желательно замульчировать.

**8** В качестве мульчи можно использовать солому, опилки или пленку.

вых работ. При этом используют кустовую и полосную схему посадки. В первом случае в течение вегетации стелющиеся побеги убирают, получая ягоды большего размера. Особенно актуально удалять побеги при посадке ранних мелкоплодных сортов. При полосной схеме ширина междурядий может составлять 70–90 см, а расстояние между растениями — 15–20 см. При посадке следят, чтобы верхушечная почка была на уровне почвы, а корни не обнажались. Правильно высаженные рас-

тения не должны вырываться из земли, если их легко потянуть за листик. Если участок переувлажнен, землянику выращивают на грядах или гребнях. Для этого формируют сплошную плодоносную полосу шириной 1 м, с обеих сторон которой делают канавки, чтобы отвести лишнюю воду.

### УХОД

Перед посадкой клубники ранней весной почву в междурядьях разрыхляют на глубину 10–12 см, в следующий раз — на

6–8 см. Глубина возделывания земли около растений должна быть на несколько сантиметров меньше, чем посередине междурядий, чтобы не повредить корни. Осенью почву снова взрыхляют на глубину 10–12 см. Рыхление особенно важно в засушливых районах.


Поливают садовую землянику в основном дождеванием и по бороздам. В период плодоношения лучше применять второй способ, используя гибкие трубопроводы. После каждого полива почву в междурядьях

разрыхляют. Чтобы уменьшить расход влаги через испарение, землю мульчируют синтетическими пленками темных цветов, а также соломой и опилками. Так ягоды будут меньше пачкаться и меньше загнивать в дождливую погоду.


### ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Потребность садовой земляники в отдельных элементах питания изменяется в течение вегетационного периода и зависит от типа почвы и погодных условий. Для молодых





Чтобы клубника не подмерзала, следует укрывать ее нетканым материалом или пленкой.



Поражение клубники грибковыми заболеваниями приводит к снижению урожайности и потерям товарного вида ягод.

растений подкормки нужны в фазе усиленного роста вегетативных органов, для плодоносных — во время формирования ягод. После уборки урожая кусты продолжают поглощать питательные вещества. В этот период увеличивается корневая система и формируются цветочные почки для урожая в следующем году. Поэтому весной следующего года после посадки на каждые 10 м<sup>2</sup> насаждений вносят по 135–180 г аммиачной селитры. Плодоносные кусты подпитывают

полным минеральным удобрением.

Эффективно и внесение комплексных удобрений с содержанием микроэлементов. Их недостаток влияет на рост и урожайность, также они необходимы для профилактики болезней. Кроме того, землянику подкармливают перегноем или хорошо перепрелым компостом (15–25 кг на 10 м<sup>2</sup>) и фосфорно-калийными минеральными удобрениями. Их вносят осенью под глубокое рыхление почвы или ранней

весной. Азотными удобрениями подпитывают клубнику рано весной, перед первым рыхлением почвы. Однако помните, что избыток удобрений негативно влияет на рост и развитие растений. Кусты опаздывают с завязыванием ягод, интенсивно растут стелющиеся побеги и розетки, поэтому снижается урожайность.

### СОРТА КЛУБНИКИ

В зависимости от сроков созревания многочисленные сорта земляники

отечественной и зарубежной селекции разделены на группы: сверхранние, ранние, раннесредние, средние, среднепоздние и поздние. Кроме того, существуют ремонтантные и полуремонтантные сорта и сорта нейтрального дня. Ремонтантная земляника бывает мелкоплодной и крупноплодной. У мелкоплодного вида ягоды красного или желтоватого цвета. Они крупнее, чем у лесной земляники, и душистые. Бывают с усиками и без них. Ремонтантные сорта отличаются более интенсивным ростом вегетативных органов, образуют больше рожков и имеют большую площадь листовой поверхности.

В последнее время получили распространение сорта с непрерывным плодоношением в течение всего вегетационного периода. Так, сорт нейтрального дня Selva уже составляет конкуренцию традиционным сортам в несезонном урожае. Он нуждается в меньших расходах на закладывание плантации и имеет большую урожайность, но при этом проигрывает по качеству ягод.

### Профилактические мероприятия



Для стимуляции роста молодых листков и для профилактики против болезней и вредителей через 20 дней после уборки урожая листья земляники скашивают. Если сделать это раньше, когда еще не закончился отток пластических веществ из старых листьев в стебли, растения ослабеют, что может негативно повлиять на их перезимовку и производительность в следующем году. Если позже, могут плохо дифференцироваться почки, так как этот процесс происходит с середины августа до сентября. В то же время не все сорта положительно реагируют на скашивание. Если на садовом участке обнаружены личинки майского жука или проволочника, перед посадкой земляники можно посеять алкалоидный люпин, зеленую массу которого в фазу зеленых бобов заделывают в почву.

Александр Андрашук, руководитель, садово-дизайнерский центр «Shoni»

### СХЕМА РАЗМНОЖЕНИЯ

Для укоренения берут материнские кусты 2-го года плодоношения. Почву поливают, розетки с небольшими зачатками корешков заглубляют в почву. Укоренившаяся рассада имеет хорошую корневую систему и 3–5 листков.





## ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА КЛУБНИКИ

**БРАЙТОН**

Ремонтантный сорт нейтрального светового дня, плодоносит до заморозков, между летним и осенним плодоношением наступает интервал около 3 недель.

**ВЕДЕНСВИЛ**

Поздний сорт, ягода похожа на большую малину, темно-красная, землянично-малинового вкуса, весит до 45 г.

**ГИГАНТА**

Ремонтантный сорт, морозостойкий. Оптимальное время для высадки — апрель-май.

**ГИГАНТЕЛЛА**

Среднепоздний сорт, не повреждается серой гнилью. С отдельных кустов урожай до 2,2 кг. Плодоносит на одном месте до 8 лет, не снижая урожайности при хорошем уходе.

**ДУКАТ**

сорт средний, зимостойкий, урожайный, устойчивый к болезням. Первые ягоды весят до 35–40 г, широко-конические, темно-красные, с плотной мякотью, сладко-десертные.

**ЖЕЛТОЕ ЧУДО**

Сорт желтой безусой земляники, морозостойкий и засухоустойчивый. Ягоды среднего размера, светло-желтые, сочные, приятного вкуса и аромата. Плодоношение с июня по октябрь.

**КАРДИНАЛ**

Полуремонтантный сорт, нейтральный к длине светового дня. Ягоды плотные, продолговатые, темно-красные, транспортабельные.

**КАРПАТКА**

Ранний сорт, ягода крупная, с приятным вкусом, светло-красная, транспортабельная.

**КАРПАТСКАЯ КРАСАВИЦА**

Ранний сорт, ягода крупная, с приятным вкусом и ароматом.

**ЛОРД**

Среднепоздний зимостойкий сорт. Ягоды крупные, плотные, ароматные, сладкие, транспортабельные. Хорошо переносят сырую погоду и мало гниют.

**ЛЮБАВА**

Ремонтантный сорт, плодоносит с июня до осенних заморозков. Применяется для вертикальной культуры выращивания. Ягоды десертные, отличного вкуса, весом до 25 г. Сорт устойчив к грибковым болезням листьев.

**ОЛЬВИЯ**

Сверхранний сорт. Ягоды округло-конические, сладкие. Устойчив к пятнистости, земляничному клещу и засухе.

**РЕФЕРЕНТА**

Сорт новейшей селекции. Ягоды конической формы, крупные, темно-красные, весят до 60 г. Сорт транспортабельный, зимостойкий и устойчивый к болезням.

**СЛАДКИЙ ЧАРЛИ**

Среднепоздний сорт, округло-конические ягоды отличаются повышенной сахаристостью и транспортабельностью, весят до 80 г. Сорт устойчив к болезням и засухе.

**СУПРИМ**

Сорт постоянного плодоношения, урожайный. Образует до 100–150 ягод в первой половине плодоношения. Плоды сладкие и ароматные.

**ХОНЕЙ (ХАНИ)**

Зимостойкий урожайный сорт, ягоды крупные, кубаревидной формы с шейкой, красные, с приятным ароматом, транспортабельные.

**ЧАМОРА КАРУСИ**

Сорт устойчив к болезням, внешне похож на сорт «Гигантелла Максим», но намного урожайнее, ягоды весят до 140 г.

**ГДЕ КУПИТЬ**

1. Национальный университет биоресурсов и природы Украины  
Киев, ул. Героев обороны, 15,  
т. 8 (044) 527-85-59,  
[www.nauu.kiev.ua](http://www.nauu.kiev.ua)

2. Садово-дизайнерский центр «Shoni»  
Киевская обл., с. Гатное,  
Киево-Святошинский р-н, ул. Дружбы, 2,  
т. 8 (044) 331-97-21,  
<http://shoni.kiev.ua>

3. Садовый центр «Тавия»  
Киев, ул. Святошинская, 20, корп. 2,  
т. 8 (044) 331-48-45, 8 (067) 504-99-10,  
<http://tavia.kiev.ua>

4. Садовый центр «Гринполь»  
Киев, ул. Жуковского, 22-А,  
т. 8 (044) 259-06-19, 257-88-88,  
<http://primrose.com.ua>

5. Садовый центр «Агрус»  
Киев, пр. Победы, 67,  
т. 8 (044) 442-82-34

6. Садовый центр «ДалаС»  
Киевская обл., Бровары, ул. Андреева, 2,  
т/ф: 8 (04494) 6-94-78

7. ЧП «Вариант»  
Херсонская обл., Каховка,  
т. 8 (050) 315-66-36

8. Садовый центр «Первоцвет»  
Днепропетровск, пос. Кировское,  
ул. Ленина, 16, т. 8 (056) 725-17-51,  
<http://primrose.com.ua>

9. Садовый центр  
Херсонская обл.  
пгт. Великая Александровка,  
ул. Набережная, 61,  
[email: zoza\\_ruban@mail.ru](mailto:zoza_ruban@mail.ru)

\*Рассаду садовой земляники реализуют в марте-мае и августе-сентябре. Уточняйте ее наличие в садовых центрах.