

Издавна считалось - в об разовом ягоднике должны расти несколько экземпляров штамбового крыжовника. Получают штамбовый крыжовник путем прививки ценного сорта в штамб золотистой смородины (в последнее время - и юшты; как штамбообразователь, юшта быстрее растет, не дает поросли, но менее засухо- и морозоустойчивая). Штамб выращивают в течение 1-2 лет из одревесневших (или зеленых) черенков, вертикальных отводков или отпрысков, которые способна давать золотистую смородину.

Одревесневшие черенки (длиной 20-22 см, с 5-6 почками) нарезают осенью (сентябрь - 15 октября) с последующей их посадкой, или в конце зимы с хранением в холоде, во влажном субстрате, до наступления теплых дней. Срезанные зимой перед посадкой черенки выдерживают в воде в течение 5-6 дней, после посадки прикрывают пленкой до начала распускания почек. В дальнейшем создают оптимальные условия для их хорошего роста. Желаемая толщина штамба 5-6 мм, высота 100-120 см.

Сорта с прямыми, сильными побегами (Неслуховский, Донецкий, первенец) прививают на штамб на высоте 80-100 см, а с дугобразными (Красень, Финик) - на высоте 130-150 см. Последние выглядят особенно нарядно, напоминая миниатюрную плачущую иву.

Прививку проводят различными способами: зимой в теплице, весной и летом в открытом грунте. Однако лучше всего крыжовник прививать ранней весной при температуре 10°C, когда растения вступают в период вегетации. Оптимальный способ - улучшенная

окулировка. Толщина черенков первой должна соответствовать толщине подвоя. Черенки заготавливают зимой и хранят в холоде (можно хранить и так, как рекомендует для косточковых Л.И. Тараненко в «Дачнике» № 2). Черенок прививают из 3-х почек, срезы делают длинные, ровные, в 4-5 длиннее толщины. Шипы для удобства работы срезают. Пример-

3-й почкой укорачивают и выполняют по всем правилам боковую прививку за кору. Если прививка прижилась, конец подвоя срезают, оставляя 10-15 см. В верхней части почки удаляют, а в нижней - оставляют, чтобы шип не засос и предохранял прививку. На штамбе появляются побеги систематически привыкаются. Остаток подвоя в ав-

ревшие, прореживаются. При надлежащем уходе растения могут давать урожай красивых, вкусных и крупных ягод и плодоносить в течение 10 лет.


В Чехии, Венгрии штамбовый крыжовник выращивают на промышленных плантациях с использованием зимней прививки. Такие растения в меньшей степени подвергаются заболеваниям, упрощается обработка почвы, обрезка и сбор урожая. Ягоды на таких деревцах крупнее, лучше окрашены, сладкие. В Польше его выращивают в присадебных хозяйствах, применяя окулировку, подбирая для подвоя лучшие формы золотистой смородины.

В журнале «Дом, сад, огород» № 3/93 агрономом С.А. Карабутом описан способ выращивания крыжовника на собственном низком штамбе. Суть его в следующем. Перед посадкой на саженце оставляют самый сильный побег, остальные удаляют. Удаляют также почки на заданную высоту штамба (20-30 см), оставляют 3-4, верхушку срезают. На следующий год весной развивающиеся веточки укорачиваются наполовину, на боковую или верхушечную почку. Куст, который имеет 4 скелетных, крест размещенных, веток и 12-15 полускелетных, считается сформированным. В дальнейшем летом (концепция) укорачивают все приросты текущего года до 4-5 см.


С годами скелетные ветви постепенно омолаживаются первоначально на хорошо развитую полускелетную ветвь.

Подготовили
Александр Федорович
АНДРАЩУК,
аспирант Института
садоводства УААН;
Александра Васильевна
ЩЕРБАК,
кандидат с.-х. наук.


г. Киев.




Способы прививки штамбового крыжовника (по О. Махерауху): а - в боковой зарез; б - вприклад; в - косым клином.



Схемы выращивания и формирования штамбового крыжовника за две вегетации.



Высота штамба крыжовника, привитого на крыжовнике (а) и смородине золотистой (б).



Штамбовый крыжовник после формирования кроны.

густе срезают, а место среза замазывают варом. Когда побеги на привое достигают длины 10 см, их привыкают для создания кроны.

Прививку можно сделать также окулировкой глазком с частью древесины в июле-августе.

Крону штамбового крыжовника формируют округлой или слегка свисающей. Выросшие ветки ежегодно, в течение трех лет, укорачивают наполовину. В дальнейшем вырезают пост-

димирович. 61005, г. Харьков, пер. Искринский, 10.

Хотите иметь современные крупноплодные сорта? Пишите. Яблоня, груша, абрикос, персик, смородина. Привитые унаби и айва. Передерий Виктор Николаевич. 69077, г. Запорожье, ул. Стратосферная, 22.

Объявления

ПРЕДЛАГАЮ

● Мини-прессы р/масла (подсолн., рапс, соя). 16 и 32 л/час, 220 и 380 В. Перевозятся в л/автом., ж. д. купе, 90 кг. Новые, заводское право. Бесплатно фото, тех. данные. г. Запорожье, тел. (0612) 68-21-97.

● Саженцы плодовых, винограда, цитрусовых и цветов по доступным ценам. Очень большой выбор. Долгий Валерий Анатольевич. 56000, Николаевская обл., пгт Казанка, ул. Горького, 129.

● Саженцы и черенки к.у. сортов винограда, юшты, смороди-

ны, семена лекарственных растений. Пивень Иван Иванович. 71700, Запорожская обл., г. Токмак, ул. Калинина, 136.

● Нимфеи, клематисы, ирисы, лилейники, декоративные кустарники, хвойники, розы, пионы, тюльпаны, многолетники. Конверт - каталог. Крячко Владимир Влади-

мирович. 61005, г. Харьков, пер. Искринский, 10.

● Хотите иметь современные крупноплодные сорта? Пишите. Яблоня, груша, абрикос, персик, смородина. Привитые унаби и айва. Передерий Виктор Николаевич. 69077, г. Запорожье, ул. Стратосферная, 22.

● По поводу размещения рекламы предприятиями, учреждениями обращайтесь по тел./факсу (0552) 24-25-75.